Downloaded from: justpaste.it/6bce7

Jak Vyléčit Hromady

Hemeroidy jsou mediálně specifikováno jako větší nebo křečové žíly ve stěně anus , které jsou interní hemeroidy , obvykle výsledkem zácpa nebo někdy , dokonce i průjmová. Nejvíce obvykle často dochází k probíhá v 3 hlavní body je rovnočastný kolem Circumference rectum. Nekomplikovaný hemeroidy jsou téměř nikdy nepříjemné ; bolestivost je obvykle v anální crack který je zlomem pokožky, který lemuje anální kanál. Primary příznak krvácí a v prvním stupni hromady, které nejsou zobrazeny v anus , je krvácení na konci překace jediným znakem . Druhý stupeň hromady vyčnívat za anus jako nepříjemná třetí stupeň hromady zůstat vně anus a vyžadovat musí být vrácen tlakem. Navštivte zde : www.hemeroidy-hemoroidy.cz pro podrobnosti.

První a druhý stupeň hemeroidy květen odpovědět na střevní hlavní směr využití vysoké vlákno dietní plán a změkčování Products . Pokud krvácení přetrvává , je třeba vložit dráždivou kapalinu být injekčně kolem zanívovaných žil, aby se mohly scvrklá. Ve skupinovém rámečku General anestezie nuavý dilatace rectum je obdobně spolehlivost.

Třetí stupeň hemeroidy často vyžadována chirurgie (hemerrhoidectomie), zvláště Pokud se konec uškrcené a Begin produkuje závažná bolest a další rozšíření.

Externí hromádky jsou buď proskrováni (kromě své typické) interní hromady nebo častěji , a pokud hromádka je čištění procedura, může být zobrazena krev květen.



Pokud , je postiženo hromady, květen může být | podrážděnost náhlá dráždivosti v anální oblasti , krvavých stoolů a některých Pain . Podráždění obvykle dochází k z důvodu faktu, že z některých hemeroidů vyčnívat (externí) z análního kanálu a tento výčnělek může dráždí okolní tkáně. Výstupek May podrážděný i .

Existuje několik rizik faktory , které může predispose osoba k vytvoření hromady. velmi první hrozba faktor je nepravidelné střevní hnutí . Například , pokud spotřebuje něco, co dělá žaludek nestabilní , opakovaná návštěvy na koupelna květen Pokud máte zácpu vzhledem k faktu, že z a špatný dietní plán, možnost nadměrný může být také příčina hromady vzhledem k tomu, že musíte potřebovat kmen a Press můžete Assist eliminovat své výkry.

Je to také možná pro ženu ke neočekávaně vytvoření hemeroidy po třetím měsíci těhotenství. Zvýšená rizikovost hrozba pro interní a externí hemeroidy je z důvodu faktu , že jako plod roste velikost, jeho rychlé prostředí (amniotické SAC) obdobně rozšiřuje . To zvyšuje tlak v pánevní region . Pokud tlak Boosts v aplikaci pánevní oblast nebo rektální oblast, hemeroidy mohou neočekávaně manifest, a to i v případě, že uživatel má nikdy hromady předchozím až.

Pokud žena vyvíjí se hromady, zatímco je těhotná a projde skrz dodávka po 9 měsících přes rodný kanál může také zhoršily se podmínky.

Navštivte svého Doctor Pokud věří, že máte hemeroidy . Přítomnost krve a mukóza na stoličce je dostačující až vyžaduje, aby Ne odložení; dříve Váš lékař se může podívat ve vašem stavu, o rychlejší .

Existuje mnoho možných léčebných procedur pro hemoroidy. Pokud vaše hromádky nejsou závažné , Váš lékař může předepsat lék, který asistence oprava . Pokud máte různých , které mají dopad vašich kvality života , můžete požádat svého lékařského odborníka o zrušení hromady pomocí Small chirurgického ošetření.