



Czy szczepionki skojarzone np. Infanrix Hexa i Pentaxim są bezpieczne?

[21 stycznia 2014 o 07:30](#)

CO USŁYSZYMY OD LEKARZA?

Że są nowoczesne i zapewniają skuteczną ochronę równocześnie przeciw 5 lub 6 chorobom, zawierają inaktywowane lub wysoce oczyszczone antygeny oraz że nie są refundowane przez państwo. Jako argument za ich wyborem rodzicom przedstawia się przede wszystkim mniejszą liczbę wkluć, na które narażamy dziecko. Usłyszymy też, że zdecydowana większość niepożądanych odczynów poszczepiennych to odczyny łagodne, najczęściej obrzęk, bolesność, zaczerwienienie i gorączka. Takie informacje są przekazywane lekarzom na konferencjach sponsorowanym przez ich producentów. A czego lekarz nam nie mówi?

NOP I POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

Rodzice nie są uprzedzani, że mogą po ich podaniu wystąpić również wymienione w ulotce i charakterystyce Infanrix Hexa: drgawki (z gorączką lub bez gorączki), kaszel, biegunka, wymioty, wysypka, zapalenie skóry, utrata apetytu, reakcje w miejscu podania, w tym stwardnienie, zlokalizowany obrzęk w miejscu podania, rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, czasem z objęciem sąsiadującego stawu, nietypowy płacz, drażliwość, niepokój, nerwowość, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno –hiporeaktywny), bezdech, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę*, rozległy obrzęk, naciek w miejscu podania, pęcherzyki w miejscu podania, reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne (w tym pokrzywka), reakcje alergiczne (w tym śwιάd), porażenie, neuropatia, zespół Guillain-Barré, encefalopatia, zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych, małopłytkowość(trombocytopenii);

Ulotka Infanrix Hexa <http://www.stopnop.pl/images/PDF/infanrix%20hexa.pdf>

Charakterystyka Infanrix Hexa http://www.stopnop.pl/images/PDF/infanrix_hexa-druki-pl-04_03_2010.pdf

- oraz działania niepożądane wymienione w ulotce i charakterystyce szczepionki Pentaxim: drażliwość, zaczerwienienie, stwardnienie, senność, biegunka, wymioty, utrata apetytu, gorączka, obrzęki obejmujące kończyny dolne, nerwowość, drażliwość, bezsenność,

zaburzenia snu , nietypowy płacz, długotrwały nieutulony płacz, drgawki z lub bez gorączki, zespół hipotensyjno-hiporeaktywny, wysypka, rumień, pokrzywka, ból w miejscu podania, obrzęk twarzy, obrzęk naczyńioruchowy, obrzęk Quinckego, reakcja i wstrząs anafilaktyczny, zespół Guillain-Barré i zapalenie nerwu barkowego po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy, bezdech.

Ulotka Pentaxim http://www.stopnop.pl/images/PDF/2012-09-07_Ulotka%20Pentaxim_23_08_2012.pdf

Charakterystyka Pentaxim http://www.stopnop.pl/images/PDF/2012-09-07_ChPL%20Pentaxim_11_07_2012.pdf

Szczepi się nimi stosunkowo krótko, bo od 2000 r., stąd w mniejszym stopniu poznano możliwe powikłania, które mogą po nich wystąpić niż w przypadku szczepionek stosowanych od dziesięcioleci.

„W Polsce powszechnie, za zgodą rodziców, podaje się szczepionki skojarzone, wiele ntygenowe, pełnopłatne. Najczęściej dzieci immunizowane są jednocześnie toksoidem błoniczym, tężcowym, antygenem krztuścowym-bezkomórkowym, polio oraz H. influenzae (szczepionka Infanrix-IPV+Hib, PENTAXIM) lub z dodatkowym antygenem wirusa WZW t. B (Infanrix hexa). Szczepienia te powtarzane są od drugiego miesiąca życia trzykrotnie co 6–8 tygodni. Dziecku do 6 miesiąca życia proponowane są także zalecane szczepienia przeciwko rotawirusom i pneumokokom (2–3 dawki). Łącznie z przeprowadzanym w pierwszej dobie życia szczepieniem przeciw gruźlicy i WZW B niemowlę otrzymuje 24–26 dawek antygeny obcogatunkowego. Nasuwają się jednak pytania: W jaki sposób na tak intensywną stymulację odpowie nie w pełni dojrzały, rozwijający się układ immunologiczny zdrowego dziecka i jego kształtujący się ośrodkowy układ nerwowy? Czy jest w stanie prawidłowo odpowiedzieć, z jednakowym efektem ochronnym, na tyle zróżnicowanych bodźców? Czy i jak zmieniają się objawy uboczne po szczepionce wielo antygenowej w porównaniu do uprzednio stosowanych szczepień?”

O szczepionkach skojarzonych. "Bezpieczne szczepienia" DR N. MED. DOROTA SIENKIEWICZ KLINIKA REHABILITACJI DZIECIĘCEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

Tutaj pełna treść: http://zdrowie.homeonet.pl/media/bezpieczne_szczepienia.pdf

Dostępne na rynku szczepionki wysoce skojarzone, podobnie jak inne szczepionki zostały poddane badaniom klinicznym, jednak warto mieć świadomość, że standardowo stosuje się podczas tych badań inną szczepionkę lub płyn zawierający adiuwanty zamiast neutralnego fizjologicznie placebo, co eliminuje z wyników część możliwych powikłań poszczepiennych.

Australijskie badanie wykryło rtęć w Infanrix Hexa.

Rtęć w szczepionkach z australijskiego kalendarza szczepień dla dzieci.

J Toxicol Environ Health A. 2010;73(10):637-40. doi: 10.1080/15287391003613994.

Abstrakt

„Pomimo usunięcia tiomersalu, konserwantu produkowanego na bazie rtęci (Hg), ze szczepionek wymienionych w australijskim kalendarzu szczepień dla dzieci niektórzy badacze i rodzice nadal niepokoją się o bezpieczeństwo stosowania aktualnego programu, po części ze względu na obawę o obecność śladowych ilości rtęci w preparatach szczepionkowych. Celem niniejszego badania było dokonanie niezależnej oceny, czy w szczepionkach dla dzieci znajduje się rtęć. Za pomocą analizatora rtęci DMA-80 do bezpośredniego pomiaru rtęci przebadano osiem szczepionek podawanych dzieciom poniżej pierwszego roku życia na obecność rtęci. Siedem z 8 preparatów nie zawierało wykrywalnych ilości rtęci (powyżej 1 ppb), ale w szczepionce Infanrix Hexa wykryto rtęć na poziomie 10 ppb. Ponowne zbadanie oryginalnej próbki potwierdziło wynik. Następnie przeprowadzono także badania trzech dodatkowych próbek preparatu Infanrix Hexa (jednej z tej samej serii produkcyjnej i dwóch z innej serii). We wszystkich trzech próbkach wynik na obecność rtęci był pozytywny (średnio 9,7 ppb). Chociaż wykryte ilości rtęci są znacząco niższe od limitów określonych w przyjętych normach bezpieczeństwa, wyniki niniejszego badania ujawniają, że publiczne komunikaty na temat zdrowia, przekazy specjalistów oraz oficjalne dokumenty zawierają nieścisłe informacje na temat zawartości rtęci, przynajmniej w odniesieniu do jednej ze szczepionek podawanych dzieciom. W interesie zdrowia publicznego jest, by producenci szczepionek oraz instytucje odpowiedzialne za ich upowszechnianie, takie jak Therapeutic Goods Administration (pol. Ministerialne Ciało Doradcze ds. Wyrobów o Leczniczym Działaniu) i Federal Department of Health and Ageing (pol. Federalny Departament Zdrowia i Osób Starszych) zajęły się tą kwestią w trybie pilnym.” <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391108>

TRAGICZNE PRZYKŁADY NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH I POWIKŁAŃ

Historia śmierci sześciomiesięcznej Basi z Kutna to nie jedyny przykład tajemniczego zgonu niemowlęcia, który zbiegł się z podaniem na krótko przed szczepionki Infanrix Hexa 6w1.

Więcej: [Wyciekł poufny dokument z GSK. Bezpośrednio po szczepieniu Infanrix Hexa zmarło 36 niemowląt. http://stopnop.pl/szczepionki/nop/158-wyciekl-poufny-dokument-z-gsk-bezposrednio-po-szczepieniu-infanrix-hexa-zmarlo-36-niemowlat](http://stopnop.pl/szczepionki/nop/158-wyciekl-poufny-dokument-z-gsk-bezposrednio-po-szczepieniu-infanrix-hexa-zmarlo-36-niemowlat)

Tabela, gdzie wyszczególniono każdy z tych 36-ciu "przypadków", zakwalifikowanych jako SIDS (syndrom nagłej śmierci niemowlęcia). Niemal połowa zgonów nastąpiła w czasie jednej doby od szczepienia. <http://vran.org/in-the-news/can-infanrix-hexa-kill-babies/>

"Przedstawiamy sześć przypadków nagłej śmierci niemowląt, które miały miejsce w ciągu 48 godzin po szczepieniu sześciowartościowym. Badania wykazały zmiany w mózgu, a dane epidemiologiczne potwierdzają, że jest związek pomiędzy szczepieniem sześciowartościowym a nietypowymi przypadkami nagłej śmierci niemowląt. Jeśli zostanie to potwierdzone w badaniach systemowych, nasze odkrycia będą miały potencjalnie poważne konsekwencje kliniczne." <http://sanevax.org/unexplained-cases-of-sudden-infant-death-shortly-after-hexavalent-vaccinations/>

Śmiertelny przypadek 3-miesięcznej dziewczynki, która zmarła w ciągu 24 godzin od szczepienia szczepionką sześciowartościową - dziecko zadusiło się na skutek ostrego obrzęku i rozedmy płuc. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18538957>

„4 lipca 2013. sędzia sądu cywilnego w Pesaro uznał, że Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za śmierć i przyznał rodzinie odszkodowanie w wysokości 200.000 euro oraz rentę 700 euro miesięcznie z kompensacją jeszcze do dalszego ustalenia. 6 miesięczna dziewczynka z Pesaro, umarła w swoim łóżku w lutym 2003 roku. Opierając się na opinii władz medycznych i konsultantów, sąd uznał związek przyczynowy między szczepieniem Infanrix Hexa a śmiercią dziecka.”<http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2013/07/04/914327-maxi-risarcimento-bimba-morta.shtml>

Według informacji od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi seria szczepionki Infanrix Hexa, którą otrzymała 2 dni przed śmiercią Basia z Kutna NIE ZOSTAŁA WSTRZYMANA ponieważ nie ma więcej doniesień o powikłaniach po niej.

DLATEGO NIEZWYKLE ISTOTNE JEST ŻEBY KAŻDY KOGO DZIECKO MIAŁO PROBLEMY PO TEJ SZCZEPIONCE ZGŁOSIŁ JE DO URZĘDU. TUTAJ SZCZEGÓŁY: <http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych>

Mamy świadomość, że problemy po szczepieniu są nagminnie ignorowane i bagatelizowane przez lekarzy. To zagraża bezpieczeństwu dzieci. Prosimy o opisywanie działań niepożądanych po tej szczepionce w komentarzach lub wysłanie wiadomości na biuro@stopnop.pl

Jak zgłosić niepożądany odczyn

poszczepienny: <https://www.facebook.com/events/175624659245429/>

Jak zgłosić działanie niepożądane szczepionki do urzędu: <http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych>

Napisz skargę! <https://www.facebook.com/events/456408027815093/>



Poniżej zebrany przegląd wpisów rodziców w związku ze śmiercią 6-ciomiesięcznej Basi po szczepionce INFANRIX HEXA (błędy oryginalne) – wpisy są zaledwie z trzech dni, więc można sobie w przybliżeniu wyobrazić skalę problemu przestępczego funkcjonowania systemu rejestracji NOP! Rejestr NOP, a tym samym teoria bezpieczeństwa szczepień jest absolutną fikcją, a faktycznie społeczeństwo ponosi gigantyczny ciężar zdrowotny, finansowy i społeczny skutków poszczepiennych !!!

Joanna Ch-R moje dziecko dostało żółtaczkę po szczepionce na żółtaczkę, trafiło na tydzień do szpitala, gdzie lekarze nie widzieli związku pomiędzy wszczepieniem wirusów, a chorobą wirusową. Uparłam się, zgłosiłam w sanepidzie. Sanepid odradził dalszych szczepień. Teraz, gdy w przychodni zmuszają mnie do zaszczepienia kolejnymi dawkami, odpowiadam, że sanepid zabronił

Agnieszka O. dzięki bogu mam za sobą już szczepionki mojej małej jak na razie i dzięki bogu nie skusiłam się że na żadne płatne typu 3w1 czy cholera wie co...ale lekarze tak namawiali że czasem człowiek się czuł jak wyrodna matka aa i co po każdej szczepionce moja chorowała ...reakcja lekarza ŻADNA!!!! cytuję noo tak mambyć to normalne.

Marta B. Mój synek po podaniu tej szczepionki krzyczał bez przerwy przez ponad trzy godziny. Miał duży obrzęk na udzie. W przychodni zignorowano te objawy gdy informowałam o tym przed kolejnym szczepieniem. Twierdzono że to normalne.

Anna L. obrzęk, bolesność, zaczerwienienie i gorączka podchodząca do 40 st a co na to lekarz? to normalne i dobrze że były odczyny bo widać że organizm walczy i nie ma po co histeryzować...

Kasia J. W ulotce jest napisane że może wystąpić bezdech a lekarz mojego dziecka powiedział że to niemożliwe w momencie kiedy miałam ostrą jazdę po szczepieniach w postaci właśnie zaniku oddychania u dziecka. Wydrukuj ten tekst i połóż go lekarzowi na biurku przy najbliższej wizycie!!!!

moje dziecko utracilo przytomnosc i to ich g***o obchodzi mam dalej szczepic i nie gadac gupot bo to nie po szczepieniu

Ignacy Ig. I prawdopodobnie nigdy już nie zaszczepię. Niestety żaden lekarz - a wielu ich stało na naszej drodze z powodu zdrowia Ignasia, nie potraktował poważnie jego problemów jako NOP:(

Dorota Nc. gdy chore dziecko trafia do szpitala, winą za stan zdrowia obarczają rodziców- bo nie zaszczepili dziecka, gdy zaś wystąpił ewidentny NOP bardzo rzadko oficjalnie chcą uznać winę szczepionki, najczęściej winni są zawsze rodzice, tak było w naszym wypadku po wystąpieniu NOP u mojej córeczki- zakażenie wewnątrzmaciczne- chociaż nie wyhodowano żadnej bakterii, tylko uczciwy lekarz powiedział po cichu o niepożądanym odczynie poszczepiennym.

Teresa G. W książeczce mam wpisane taką : Infanrix IPV+Hib i nie wiem czy to dokładnie ta sama, ale po szczepieniu 10.01.2013 r. moja córeczka niespełna półroczna wtedy na drugi dzień dostała zapalenia oskrzeli. Lekarka wmawiała, że to nie od tego...

Aneta Marta Magdalena D. 6w1 nop-y u mojej corki m.in duszenie sie, problemy psychiczne itd. = decyzja nie szczepie. [...] Moje dziecko jedynie uratowala modlitwa.

Monika O-P. A co do lekarzy z przychodni to już dawno pisałam, że pracują jak w fabryce. Miałam odwagę odmówić szczepienia dziecka i jest dziś ze mną. Dwa dni po stwierdzeniu, że dziecko można szczepić znalazło się ono w szpitalu z zapaleniem płuc, poważnymi bakteriami i znacznym przekroczeniem norm bilirubiny (ostatnie na papierze przeze mnie pokazywane lekarzowi). W szpitalu poinformowano mnie, że przy samych wynikach jakie pokazałam lekarzowi szczepienie winno być odroczone... Brak słów!!!!!!!!!!!!!!

Natalia Śn. Ból w miejscu wklucia, do tego stopnia że Córka na dotyk wzdrygiwała sie nawet przez sen. Przez dobę nie chciała nawet ruszyć nozka trzymając ciągle napiętą.

Monika K. U nas po obu dawkach: 1. wysoka gorączka (40st) przez równe 48h, 2. zmiana całkowita zachowania: przestała na kilka tygodni przesypiać noce, rozdrażnienie; budzenie się z krzykiem w nocy; 3. AZS (nie wiązane bezpośrednio z Hexą), 4. Ból w miejscu szczepienia i płacz przy najmniejszym dotyku tej okolicy przez 72h.

Agnieszka Jan.-Kw.17 grudnia moja córka była zaszczepiona infarix hexa, w 10 tyg życia. Dzień później straciła przytomność na kilkanaście sekund, zdrętwiała jej prawa rączka i nóżka,

wylądowaliśmy w szpitalu, neurolog wykluczył, że to po szczepieniu, badania usg głowy i brzucha, morfologia, mocz i eeg prawidłowe. Do dziś totalny brak odporności: najpierw jelitówka po szpitalu, potem katar, gardło, ogólne przeziębienie i osłabienie, a to już miesiąc temu. Czy dalej mamy szczepić? Termin kolejnego szczepienia za 2 tygodnie!

Anetti E. A możliwe, że dziecko po szczepionce stało się nerwowe i nadpobudliwe? Moja córka dostała łącznie już 3 dawki i zastanawiam się czy to może mieć związek ze szczepionkami

Aleksandra Gin. Po szczepionce Infanrix Hexa moja córka dostała ostrej biegunki trwającej ponad tydzień. Do tego gorączkowała przez 2 dni. Pediatra zwała winę na zabkowanie, co było totalną bzdurą bo pierwszy zab wyskoczył dopiero po 5 miesiącach. Zupełna ignorancja ze strony lekarza.

Magda Siko. Masakra jakas Szczepilam 2 dzieci szczepionka 5 w 1 i mój starszy syn non stop chory, 4 razy zapalenie płuc, młodsza córka też ciągle chora ale nie szczepilam jej ostatnią dawką przypominającą ze względu na ciągle chorowanie i chyba tego nie zrobię poradzcie co robić ?????

Anna Gni. [...] Moja córka ma teraz 20 miesięcy i przez prawie rok nie przesypiała mi nocy, budziła się z krzykiem, była (a raczej jeszcze jest) nadpobudliwa. Wszystko to zaczęło się w styczniu zeszłego roku w parę dni po podaniu szczepionki 6w1. Zrobiliśmy jej serię badań wzduż i wszecz i wszystko ok więc najprawdopodobniej to przez szczepienie. [...] ostatnie szczepienie we wrześniu tamtego roku skończyło się wysoką gorączką (40 stopni) i złym samopoczuciem, córka była bardzo nerwowa i marudna, całą noc krzyczała a ja nie wiedziałam jak jej pomóc

Katarzyna Moz. szczepiliśmy 6w1 infanrix hexa i nasz syn ma autyzm

Anna Lip. Gorączka ponad 39 stopni przez 4 doby, wyjątkowo oporna do zbicia. Całkowita utrata apetytu na miesiąc, gehenna z karmieniem. Synek zwykle bardzo pogodny i ożywiony, po szczepieniu był przez długi czas rozkojarzony, płaczliwy, rozdrażniony. Na szczęście szczepienia miał odroczone i pierwszą dawkę szczepienia miał w 6 miesiącu życia a nie w drugim, bo aż boje się myśleć, jak mogłoby się to skończyć.

Anna War.-To. Zaraz po szczepieniu silna opuchlizna szczepionej kończyny, utrzymująca się przez 5 dni, a potem bardzo ostry AZS.

Paulina Ser. no i u mnie po szczepieniu mała stała się bardzo nerwowa, nadpobudliwa, szybko wpadała w złość i spała 13h przez 2 tygodnie po szczepieniu...do tego pierwsze 2 dni

gorączka 39 stopni i ogólne osłabienie organizmu.

Beata Si. moje dziecko dwukrotnie po szczepionce wylądowało w szpitalu...rozpoznanie śródmiąższowe zapalenie płuc wysoka gorączka, nikt nawet nie pomyślał choć sugerowałam, olali i tyle, [...]

Magda Tokł. Synek po 6w1. 2 tygodnie nie spał-krótkie drzemki tylko na rękach i w dzień i w nocy. Non stóp płacz, gorączka, obrzek w miejscu wkłocia. Lekarz przyszedł i powiedział że przesadzam. Po drugiej dawce infekcja dróg oddech z gorączka

Jolanta St. Mój Synek dostał NOP po III dawce Infarnix Hexa, to było 6 października 2010 r. 5 godzin po szczepieniu miał miejsce krzyk mózgowy, potem powoli wyłączały się w dziecku poszczególne funkcje wcześniej nabyte typu uśmiech na widok znanej twarzy, odwracanie głowy w kierunku słyszanego dźwięku, gaworzenie, zabawa grzechotką, dziecko miało 5 miesięcy. 10 dni po szczepieniu dziecko obłe, obniżone napięcie mięśniowe, brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na bodźce, jedyne objawy to krzyk, poza tym, wyginanie w literę C, zaparcia do 6 dni u dziecka karmionego wyłącznie piersią, stwierdzone opóźnienie w rozwoju. częste bardzo widoczne pulsowanie ciemienia.

Irena Kry.-Bi. mój synek ma opóźnienie mowy (w badaniu EEG we śnie wyszło zaburzenia w obszarze mowy i wylądowania padaczkowe) a nie całe 2 miesiące później wykryto nowotwór kości mięsak Ewinga! w 14 mieś.dostał 4 dawkę szczepionki przeciw pneumokokom Prevenar 13 a wcześniej dostał 3 dawki Prevenar. Na bilansie dwulatka zbagatelizowano jego brak mowy...więc napewno wyślę skargę!!!

Beata Si. Mój synek wyszedł ale...po tym pierwszym szczepieniu, w dniu porodu przeszedł zapalenie płuc, z czterem odmami, a po tych kolejnych tylko hospitalizacja, i leczenie antybiotykami wszystkie pobyty z rozpoznaniem zapalenia płuc zmiany w obrazie RTg brak zmian osłuchowych

Anna Szlą. po 3 dawce Infarnix córka w ciągu dwóch tygodni przestała się rozwijać i zaczęły się pierwsze napady padaczkowe

Aleksandra Sech. Druga dawka Infanrix Hexa. 11 godzin później: zaczęło się od przeraźliwego płaczu. Uspokoila się na dwie minutki i zaczęło się.. Zaczęła się dusić, nie umiała złapać powietrza. Najpierw zsiniały wargi, później cała buzia. Co jakiś czas łapała oddech i znowu go traciła. Później zaczęła tracić przytomność, ale na szczęście jakoś udało mi się ją 'ocucić'. Przed przyjazdem karetki wszystko ustało. W szpitalu PEDIATRA ją tylko osłuchiwała i stwierdziła, że pewnie zachłysnęła się śliną albo ścisnęłam ją za nóżkę..

Na wypisie widnieje 'niespokojna po szczepieniu'. Ani słowa o duszeniu się i sinieniu..

Jolanta Sta. STOP NOP - po tej szczepionce moje dziecko cofnęło się w rozwoju, było to dramatyczne, w wieku 7 miesięcy, położone na brzuszku ledwo dźwigało głowę, przez prawie rok odnosiłam wrażenie, że moje dziecko to oddychająca szmaciana lalka obojętna na wszystko. Walczyłam o rehabilitację, ale neurolog w moim mieście uważał, że wszystko jest w porządku. Dopiero neurolog we Wrocławiu wystawił skierowanie na rehabilitację. Pediatra bez cienia wątpliwości zgłosił NOP, był to drugi przypadek tego typu w jego przychodni. Walka o dziecko polegała na ponad rocznej żmudnej, ciężkiej rehabilitacji, którą dziecko bardzo źle znosiło, a ja miałam podejrzenia o autyzm, bo tak synek reagował na rehabilitację i nie było żadnej współpracy i tym samym nadzieje na wyzdrowienie blakły, jednakże walczyłam nieustannie. Jednocześnie prowadziłam odtruwanie homeopatyczne i pilnowałam diety. Pojawiły się sukcesy. Gdy dziecko skończyło ponad rok, pierwszy raz samodzielnie usiadło, zaczęło raczkować w wieku półtora roczku, a pierwszy samodzielny krok wykonało tydzień przed drugimi urodzinkami. Jednakże reperkusje tego szczepienia, chociaż może i wcześniejszych także, odczuwamy po dziś dzień i pewnie odczuwać będziemy. Dziecko bardzo często choruje, ponadto ma stwierdzoną alergię wziewną praktycznie na wszystko, przed nami dalsze badania, ponieważ problemy pokarmowe nie zostały rozwiązane, także podejrzewamy alergię pokarmową, do tego dochodzi nadpobudliwość, drażliwość, kłopoty ze snem. Aż trudno uwierzyć, że nasz przypadek może być osobiwy odnośnie zgłoszenia NOP do sanepidu. Jest wpis o NOP w karcie szczepień, jednakże lekarz odmówił odnotowania tego faktu w książeczce zdrowia dziecka i nawet dzwoniłam do sanepidu z pytaniem, czy jest jakaś możliwość, by zmusić lekarza, aby tego wpisu dokonał, i niestety, takiej możliwości nie ma.

Aneta Marta Magdalena Do. Wydaje mi się że szkodliwość szczepionki nie jest zależna od nazwy firmy lecz że wszystkie 6w1 są szkodliwe. Szczepiłam dziecko 6w1 + rotavirus= 7 w 1 czasie w Anglii/ tu nie podają nazw firm/ a też miało mnóstwo powikłań i nie tylko typu lekkie: gorączka, biegunka, wymioty lecz poważne typu duszenie się, drgawki, jakby paraliż mowy, problemy psychiczne/ciągłe machanie głową, drapanie się, dziwne ataki płaczu, krzyku/ i wiele innych ponad 20..

Kornelia Izyd. SYN MOJEJ SIOSTRY PO SZCZEPIONCE 6W1 ZATRZYMAŁ SIĘ Z ROZWOJEM... DO TEGO BRAK APETYTU I WIELKI, WIELKI PŁACZ.... było to 6 lat temu, dzięki rehabilitacji dziecko jest dobrze rozwijającym się chłopcem bez powikłań. Ale nie chce myśleć co by było gdyby nie rehabilitacje.

Karolina Pię. raz w życiu zaszczepiłam niedoleczone dziecko. Pielęgniarka przekonywała mnie, że to tylko katar, nic się nie stanie. To było polio plus błonica-tężec-krztusiec. Następnego dnia, kiedy jechaliśmy w nocy do lekarza, z córką o prawie 39 st gorączki, która

narzekała na silny ból lewej strony ciała, postanowiliśmy, że nigdy więcej nie zaufamy osobie namawiającej do szczepienia. Zaszczepienie dziecka z katarem skończyło się sześciotygodniową infekcją, przewlekłym katarem z gorączką, a finalnie- zapaleniem obu stronnym ucha środkowego, co rozpoznaliśmy dopiero, kiedy córka przestała nas słyszeć. Nie wspomnę o takich atrakcjach podczas wcześniejszych szczepień, jak zachorowanie dziecka na różyczkę dokładnie 8 dni po szczepieniu na różyczkę. NIKT NIGDY nie donotował zgłaszanych przez nas silnych odczynów poszczepiennych...

Aneta Grzyb. Dziecko mojej koleżanki było całkowicie zdrowe, dostało szczepione skojarzona m. innymi na rotawirusa i dostało ostrego zapalenia płuc, później jeszcze inne zakażenie bakteryjne całego organizmu, leżało tydzień w śpiączce

Kamila J.-Ruch. A może w karcie szczepień wpisują czym szczepili i numer serii? Córka miała 16 dawek ostatnie szczepienia w 2009 roku dopiero pojawia się poprawa jej samopoczucia i ból głowy zelżał trochę ...w jednym skierowaniu mam diagnozę cephalitis- zapalenie mózgu...chciałabym sprawdzić te wszystkie ulotki szczepionki tylko skąd mam wiedzieć które jak mam tylko daty w książeczce dziecka...?

Anna Wa.-Śm.Jestem mamą 4 miesięcznej Natalii w listopadzie córka dostała pomimo kataru szczepionkę 5 w 1 . Około 2 godzin po szczepieniu dziecko miało 38.5 gorączki wieczorem już 40.0 stopni gorączki byłam bardzo przestraszona dzwoniłam w ten dzień do przychodni ale nikt nie odbierał . Na drugi dzień gorączka ustąpiła ale mała i tak jeszcze przez 3 doby zachowywała się nienaturalnie ciągle spała albo płakała . I moje pytanie czy dalej szczepić ? Odwlekam o od grudnia a po wczorajszej informacji na samą myśl o szczepieniu małej boli mnie żołądek . Poradźcie co robić ?

Ilona Głuch. Po szczepieniu dziecka wyładowaliśmy w szpitalu. W miejscu, gdzie powinno się pomagać czulam się jedyną odpowiedzialną za stan jego zdrowia. Mieliśmy DUZO szczesia. Teraz już wiem, że ząbkowanie też jest przeciwwskazaniem do szczepień!

Nasz synek poza rozpulchnionymi dziąsłami nie miał żadnych innych oznak. Do tego by zauważyć 6 zębów musiał być potrzebny chirurg i radiolog o 2 w nocy na oddziale dziecięcym. Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że dziecko nie powinno zostać zaszczepione.

Badanie dziecka przed szczepieniem wygląda gorzej niż wizyta z psem u weterynarza!

Krzysztof Stef. Nasza córcia była szczepiona w 3cim miesiącu życia po raz ostatni. Od tamtego czasu zupełnie zrezygnowaliśmy ze szczepień. Badanie kwalifikacyjne do wspomnianego szczepienia wyglądało tak, że w kabarecie lepiej by tego nie zagrali Lekarz

spojrzał na dziecko i mówi: jest ok, można szczepić

Bożena Syn. Moje dziecko też zostało zaszczepione podczas choroby, kaszel i katar, a także osłabienie nie były dla lekarki przeciwskazaniem...Od razu zaczęły się problemy z górnymi drogami oddechowymi, powiększyły się migdały, wreszcie ciężkie zapalenie krtani, gardła, szpital, roczny katar, tysiące wizyt u wszelakich specjalistów, łapanie każdej infekcji-mimo dbania o wszystko. Postanowiłam, że już nigdy nie zaszczepię. Dziś syn ma 3 latka, wycięte 3 migdałki, chronię go przed infekcjami, bo gdy coś złapie, to ciągnie się długo... Młodszy synek ma 1,5 roku, nie był szczepiony na nic, zachorował RAZ teraz po świętach, zniósł to dzielnie, a starszy męczy się nadal... I ja mam się tłumaczyć instytucjom, dlaczego uważam szczepienia za zło????!!! A pieniądze na lekarzy, cierpienia dziecka i zabraną mu odporność...KTO NAM TO ZWRÓCI???

Beata Zab. U nas w przychodni to standard, kaszel, katar, stan podgoraczkowy- szczepimy. Na mnie patrzą jak na wariatkę, bo czekam aż dziecku nic nie będzie

Ania Mo. Niestety lekarze dają szczepionki nawet dziecku z chorymi oskrzelami, na antybiotykach. Mnie się to zawsze przytrafia, że chcą szczepić syna jak jest chory, a ja zawsze jako rodzic mówię im, że uważam, że dziecko jest chore i lepiej poczekam ze szczepieniem aż wyzdrowieje...

Marta K. mam dziecko chore po szczepieniach ... nie zaufam im już nigdy i dziecka więcej zaszczepić nie dam!

Agata P.-G. a mnie zmusili do szczepień, zagrozili karą, konsekwencjami, wydzwaniali, zmuszali itp...tak w kółko

Martusia S. ja kiedyś przed szczepionką zadzwoniłam do przychodni że córka ma stan podgoraczkowy. stwierdzili że taka gorączka to nie gorączka i oni szczepia i nie przeloza mi wizyty. PO PROSTU NIE POSZLAM. (Warszawa przychodnia na Fieldorfa)

Kamila Elżbieta Ka. To ja wysłałam maile. Zaden z lekarzy których prosiłam nie chce zgłosić nop po szczepieniu w czerwcu. A teraz dostałam kolejne wezwanie na szczepienie... prędzej święta zostaną niż pojde! A nop sama zgłosze!

Lilia N. chce zgłosić nop zgłaszałam go sanepidowi i lekarce ale mnie wysmiali 6 godz po szczepieniu infanrix hexa moje dziecko straciło przytomność (3,5 msc) powiedzieli że to przez bakterie e.coli która wykryli w moczu podczas pobytu na o. dziecięcym

Zmora Dzi. Pierwsze dziecko - aż do MMR którego nie wprowadziłam już do organizmu dziecka. Od drugiego dnia życia, alergia. Potem doszła astma i AZS. Ciągnę się do dziś. Ciągłe zapalenia płuc, oskrzeli, temperatury maksymalne, CZD, alergolodzy, nawet psycholog, po jednym szczepieniu krzyk przez 24 godziny. Karetka przyjechać nie chciała. Nie wiedziałam wtedy że to był krzyk mózgowy prawdopodobnie. Średniak tylko wzwb - mam wyrzuty sumienia bo też średni poziom odporności aż do 4 roku życia. Najmłodsza bez szczepień ma 10 miesięcy. Starszaki w jej wieku już byli po trzech lub czterech antybiotykach. Ta ledwo katarzki z lekką gorączką jeden raz.

Beata W-r Marlena Kwaskowo Kubkowska wiem, że tak jest, bo doświadczyłam tego na własnej skórze. Jedno dziecko szczepione wg kalendarza (bo też mi się wydawało, że dobrze robię, a lekarz ma na celu dobro mojego dziecka) i cała masa różnych problemów zdrowotnych począwszy od początków sepsy po pierwszym szczepieniu w 1 dobie, skończywszy na strasznych bólach stawów i głowy. ŻADEN lekarz nie chciał przyznać NOP-a, a pojawiały się po każdym kolejnym szczepieniu. Ja wtedy nawet nie miałam pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak NOP. Dopiero rehabilitantka nas 'oświeciła', dalej już my z mężem zaczęliśmy zgłębiać temat sami. Drugiego dziecka nie zaszczepiliśmy w ogóle. Nie choruje W OGÓLE oprócz 3 dniowej, nie groźnej infekcji wyleczonej końskimi dawkami wit.C. Rozwija się super, szybko się uczy nowych rzeczy. Ze starszym dzieckiem jest pod tym wzgl. duuuży problem, bo brak koncentracji, logicznego myślenia, trudności w kojarzeniu itp. Tak więc, reasumując brak informacji ze str. lekarzy nt. szczepień i ich szkodliwości, a nie tylko "różowości" oraz zwykła ludzka ufność rodziców do pediatrów często się tak kończy: 'mądry Polak po szkodzie'. Bo kto przestaje szczepić? W większości rodzice, którzy doświadczyli ciężkich uszczerbków na zdrowiu swoich dzieci. A naprawdę nie jest ich mało.

Joanka A. ja przestałam szczepić...niestety zbyt późno, moje najmłodsze dziecko po szczepionce przestało się prawidłowo rozwijać i przejawia cechy autystyczne...starsze dziecko po każdym szczepieniu reagowało silną alergią-zostało tak na stałe, najstarsze dziecko przez 10 lat szczepione zgodnie z kalendarzem ma problemy z koncentracją i kojarzeniem, silne napięcia, ślepa i głucha byłam ale od ponad roku nie szczepimy się na nic!!! dzieci od tego czasu zdrowe, nie mają żadnych infekcji!

Joanna W. kiedyś miałam możliwość rozmowy z lekarzem, który powiedział mi dobitnie nie szczep więcej, na moje pytanie czy on szczepił swoje dzieci powiedział mi "absolutnie nie"

Beata Fr. piękny fragment znalazłam "Wykazano, że rutynowa rezygnacja ze szczepienia dzieci z powodu łagodnej choroby może istotnie zakłócić i utrudnić realizację programu szczepień. Jeżeli istnieje ryzyko, że rodzice nie zgłoszą się z dzieckiem ponownie w wyznaczonym terminie, należy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać do szczepienia

każdą nadarzającą się okazję."

Em Ce K. Dwa dni temu usłyszałam od koleżanki pielęgniarki, że nie wierzy w szczepienia, bo przekonała się na własnych dzieciach, że są nieskuteczne (podała przykład: córka była zaszczepiona przeciwko odrze - dawniej było to szczepienie pojedyncze, a syn nie dostał szczepionki MMR i to właśnie zaszczepiona córka przyniosła do domu pełnoobjawową odrę, a syn nieszczepiony wcale nie zachorował! W jednym domu miał styczność z chorą siostrą i nie zachorował, a "wysyp" odrzy w pobliżu ich miejsca zamieszkania dotyczył właśnie dzieci zaszczepionych na odrę. Czy to nie dziwne?

Marta G. Moja córka ma 2 lata, gdysie urodziła też chcieliśmy ją szczepić skojarzonymi ale osoba która pracuje przy tych szczepionkach powiedziała by tego nie robic, szczepie "starymi" i wydłużam maksymalnie czas między szczepieniami. W przychodni patrzec na mnie nie moga bo nie wykupuje płatnych szczepionek. Ciesze sie ze nie uleglam naciskom pani doktor.

Kamila Jó.-Ruch. niestety w małych miastach nie spotkałam się z wpisywaniem nazw szczepionek i nr serii w książeczki dzieci jest tylko data szczepienia... postaram się zeskanować i wstawić to co mam w książeczce zdrowia dziecka na fb...

Agnieszka Wrób. Przekładałam 3-cie szczepienie synka 3 razy z powodu przeziębienia. Jak w końcu dotarłam na szczepienie pani doktor była oburzona, że mamy aż 3-miesięczny poślizg. Oczywiście usłyszałam komentarz, że przy przeziębieniu można szczepić.

Bożena Pi.-Tor. niestety sama znam przypadek że jeśli jest gorączka i dziecko jest markotne i jest po szczepieniu to mówią że to normalne i nigdzie nie zgłaszają dopiero jak umrze to jest afera

Agnieszka J.K.: 30 godzin po szczepieniu 6w1 Infarix Hexa (dziecko 2,5 m-ca) - utrata przytomności, brak kontaktu, wyprężenie prawej rączki i nóżki, natychmiast szpital, badania pod kątem padaczki, ale także ogólne. Po 3 dniowej obserwacji wypis do domu, po szpitalu jelitówka i miesiąc ciągnące się przeziębienia, kaszel, katar.... Niekompetentni lekarze, z którymi się spotkaliśmy, do tej pory nie zgłoszony niepożądany odczyn poszczepienny, ale walczyliśmy.

(przy pomocy pań z sanepidu udało się doprowadzić do zgłoszenia NOP i ukarania lekarza)

Agata L.: U nas po Infanrix Hexa i Rotarix obniżenie napięcia w osi, wzmożone napięcie w rękach i nogach, dziecko ciągle senne. brak kontaktu wzrokowego. Po drugiej dawce, na której podanie się zgodziłam mimo złych doświadczeń - biegunka, zatrzymanie rozwoju motorycznego i jeszcze większe napięcie. Dziś nam diagnozują mózgowie porażenie

dziecięce, a zmian w mózgu nie ma.

Marcin Z.: Problemy zdrowotne u Emilki wystąpiły niecałe dwa dni po podaniu ostatniej serii szczepień Infanrix Hexa, Rotarix, Synflorix, czyli 22.04.2011r. Pierwszymi objawami jakie zostały zaobserwowane były napady drgawkowe łączone z oddawaniem stolca i podwyższoną temperaturą. Obecnie córka ma skończone 3 lata. Emilka ma opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Nie trzyma główki, nie siada, nawet nie wkłada rączek do buźki nie wspomnę o mówieniu czy reagowaniu na bodźce zewnętrzne głos, dotyk itp. Leki, które zostały wprowadzone w celu zmniejszenia ilości napadów nie dały żadnych rezultatów. Stwierdzono u Emilki padaczkę lekooporną i zaproponowano dietę ketogenną. Od 2 lat jesteśmy na owej diecie dzięki czemu liczba napadów zmniejszyła się o połowę, a rehabilitacja może odbywać się częściej i dawać lepsze rezultaty. Malutka lepiej kontroluje ułożenie głowy, zmniejszyło się napięcie mięśniowe w kończynach dolnych, ręce nadal są słabe chociaż coraz częściej próbuje zbliżać je do twarzy. Dieta jest uciążliwa, wiąże się z dokładnym odważaniem produktów spożywczych (co do 1gr produktu), które niestety w głównej części składają się z tłuszczu. Malutka niechętnie jadła mieszanki przygotowane domowym sposobem. Nie jedząc całych porcji trudno było wprowadzić ją w stan ketozy niezbędny do działania przeciw napadowego. Około 8 miesięcy temu zaczęły się poważne problemy z odruchami wymiotnymi spowodowanymi nawet minimalną ilością wody (czy jakiegokolwiek płynu). Emilka trafiła kilkakrotnie do szpitala z powodu odwodnienia i po różnych próbach nawadniania (kroplówki, sonda poprzez nosek do brzucha) zdecydowano się na założenie PEG-a (rurka wprowadzona przez powłoki brzuszne bezpośrednio do żołądka). Karmienie bezpośrednio do żołądka pomaga nam w dostarczeniu Emilce niezbędnej, dobowej ilości wody. Obecnie Emilka trafia do szpitala co 5-6 tygodni. Problem z zanikającym mózgiem (coraz gorsze wyniki w rezonansach) spowodowany przez chorobę metaboliczną (nie zdiagnozowaną – i raczej tak zostanie) grozi uszkodzeniem pnia mózgu co doprowadzi do zaniku podstawowych czynności życiowych takich jak oddychanie czy praca serca u Emilki. Taki scenariusz oraz brak jakiegokolwiek ratunku przedstawiony został nam przez lekarzy. Emilka, wg lekarzy, ma nie doczekać swoich 10 urodzin.

L.N.: Córka pierwsze szczepienie otrzymała zaraz po porodzie, rozwinęło się jakieś zapalenie. Lekarze powiedzieli, że zaraziłam ją gbs bo był dodatni i podali jej penicylinę. Jak miała 2 tygodnie wyszła skaza białkowa, więc kazali odstawić od piersi i podawać Bebilon Pepti. W wieku 3 tyg. zakażenie dróg moczowych i tygodniowy pobyt w szpitalu. Powiedzieli że zapalenie było od złej higieny dziecka, co uważam za absurd bo dziecko było codziennie myte i dbałam o higienę. W wieku 10 tygodni dostała szczepionkę Infanrix Hexa - w nocy lekki stan podgorączkowy i dalej było wszystko dobrze. W wieku 3,5 miesiąca po kolejnej dawce tej

szczepionki po 6 godz. utrata przytomności. Na oddziale zrobiono badanie moczu - wyszła bakteria. Powiedziano nam, że utrata przytomności nie była z winy szczepień, ale przez bakterie. Dodam, że przed szczepieniem były robione badania i bakterii nie było. W tej chwili dziecko ze względu na uczulenie jest na diecie bezmlecznej i bezglutenowej.

NIE MILCZ! WYŚLIJ SKARGĘ! WZÓR

TUTAJ <https://www.facebook.com/events/456408027815093/?ref=5>

[Lubię to!](#) · [Dodaj komentarz](#) · [Udostępnij](#)

- Karolina Pobol, Artur Iksiński, Jolanta Lewandowska i 79 innych osób lubią to.
- [143 ponowne udostępnienia](#)



Agata Lange M[Zobacz tłumaczenie](#)

[21 stycznia 2014 o 07:32](#)



Kasia Jacak W ulotce jest napisane że może wystąpić bezdech a lekarz mojego dziecka powiedział że to niemożliwe w momencie kiedy miałam ostrą jazdę po szczepieniach w postaci właśnie zaniku oddychania u dziecka. Wydrukuj ten tekst i połóż go lekarzowi na biurku przy najbliższej wizycie!!!!

[21 stycznia 2014 o 07:41](#) · [20](#)



Karolina Woźniak Nie mogę udostępniać Emotikon frown

[21 stycznia 2014 o 08:17](#)



Daria H-n Czy ktos sie orientuje czy mozna przestac szczepic dalej dziecko, po dwoch dawkach Pentaximu?

[21 stycznia 2014 o 08:23](#)



Kasia Jacak Daria Hagen z tego co wiem to można

[21 stycznia 2014 o 08:23](#)



Daria H-n Kasia Jacak dziekuje za odpowiedz. Czy sa jeszcze inne osoby ktore moglyby odpowiedziec na moje pytanie?

[21 stycznia 2014 o 08:26](#)



Ignacy Ignacówka Ja przestałam. I prawdopodobnie nigdy już nie zaszczepię. Niestety żaden lekarz nie - a wielu ich stanęło na naszej drodze z powodu zdrowia Ignasia, nie potraktował poważnie jego problemów jako NOP:(

[21 stycznia 2014 o 08:31](#) · 2



Ania Laskowska obrzęk, bolesność, zaczerwienienie i gorączka podchodząca do 40 st a co na to lekarz? to normalne i dobrze że były odczyny bo widać że organizm walczy i nie ma po co histeryzować...

[21 stycznia 2014 o 08:34](#) · 1



Mohamed Caterina Kenna Jest logiczny fakt , ze wszystkie szczepionki sa smiertelne!!!!!!ludzie obudzwie sie.....jammojej corci nigdy bym czegos takiego nie zrobila.....ma juz4 latka i jest zdrowa jak ryba.....nigdy nie miala goraczki....wystarczy czystosc dziecka , wyzywienie oraz witaminy i milosc....

[21 stycznia 2014 o 10:06](#) · 8



Mohamed Caterina Kenna Zyjemy we wloszechoczywiscie na wezwania szczepienne pojechalam i poprosilam gwarancji , ze dziecku nic sie nie stanie!powiedzieli mi , ze

gwarancji mi nie mogą dać....udokumentowałam się i nigdy nie zaszczepię ani siebie ani mojej córki....ludzie tutaj jest gra o życie !!!!!!!

[21 stycznia 2014 o 10:10](#) · [8](#)



Magda Myślicka popieram!moje dziecko nieszczepione kompletnie nie choruje, synka zdrowo odżywiam, ruch świeże powietrze i jest ok.

[21 stycznia 2014 o 10:22](#) · [2](#)



[Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP](#) Póki co są tu rodzice dzieci okaleczonych wskutek powikłań poszczepiennych bo wierzyli w ich bezpieczeństwo.

[21 stycznia 2014 o 10:57](#) · [14](#)



Magda Myślicka Hmm nie ma co dyskutować z Panem Czapa i jego inwektyw, widać, kto tu reprezentuje ciemnogród. Każdy ma prawo wyboru...ale im więcej człowiek wie na temat substancji szczepionkowych tym bardziej jest daleki od serwowania ich własnemu kochanemu dziecku

[21 stycznia 2014 o 11:38](#) · [Edytowany](#) · [4](#)



Magda Myślicka Każda szczepionka powinna zostać opisana w sposób umożliwiający zapoznanie się z wiążącym się z nią ryzykiem. Każda z osób rozważających szczepienie powinna zostać poinformowana o przypadkach zgonów, niepełnosprawności czy trwałego uszczerbku na zdrowiu powiązanych ze szczepieniami.

[21 stycznia 2014 o 11:20](#) · [4](#)



Magda Myślicka Na zdrowiu się dziś nie zarabia. Zarabia się na „leczeniu” CHORÓB. Im więcej chorób, tym więcej KASY i przemysł się kręci

[21 stycznia 2014 o 11:24](#) · [13](#)



Ewa Żełem Madziu popieram!

[21 stycznia 2014 o 11:41](#) · [2](#)



Kaha Kopec Dedykuję zwłaszcza tym, którzy: "nie chcą sobie zaśmieszać mózgu, bo ich dziecko jest zdrowe".

[21 stycznia 2014 o 11:42](#) · [Edytowany](#)



Kasia Zoń Ja mam pytanie: jaka jest różnica pomiędzy wstrzyknięciem szczepionki skojarzonej a wstrzyknięciem trzech szczepionek nieskojarzonych jednego dnia tak jak jest w kalendarzu szczepień - mówię o szczepionkach refundowanych. Teoretycznie też wstrzykuje się 5 świństw naraz. Czy jest jakaś różnica, że jedna skojarzona gorsza niż trzy nieskojarzone (no dwie nieskojarzone plus błonica-tężec-ksztusiec skojarzone).

[21 stycznia 2014 o 12:23](#) · [5](#)



Magda Tymczyszyn Zapytajmy p.Czapa jaki jest skład szczepionek ? I jakie skutki mogą wywołać dla organizmu??? Kretyni?ciemnota ? Chyba u pana

[21 stycznia 2014 o 13:25](#) · [1](#)



Waldemar Potoczny Eheheheeee... WZW. Przecież noworodki nie robią sobie tatuży a zabiegi i operacje są przeprowadzane w sterylnych warunkach, więc po co szczepić przeciw WZW noworodki z nieukształtowanym jeszcze systemem odpornościowym i to prawdopodobnie bez zgody rodziców, skoro pierwsza dawka podawana jest w ciągu pierwszych 24 godzin od narodzin!!!

[21 stycznia 2014 o 13:46](#) · [7](#)



Monika Krześniewska Moja córka ma 1, 5 roku i pozostała jej 3 dawka pentaxim. Po drugiej miała wysoką gorączkę i biegunkę ogólnie objawy jak grypy. Zgłosiłam ten fakt ale lekarze i pielęgniarki z przychodni wysmiali mnie i powiedzieli że zbieg okoliczności i dziecko miało infekcję. Teraz boję się zaszczepić tą trzecią dawkę a dodatkowo pani straszy mnie sanepidem. Help

[21 stycznia 2014 o 14:19](#)



Agnieszka Nieszporek Monika Krześniewska sorki, ale czy Ty jesteś 10-cioletnia gówniara, żeby Cię jakaś zakichana baba z przychodni straszyla?.... Wyrażasz zgodę na szczepienie poprzez doprowadzenie dziecka do tej rzeźni zwanej punktem szczepień - nie przychodzisz, znaczy nie zgadzasz się i bez żadnego podpisywania ich zasranych bezprawnych oświadczeń... Nie mają prawa naciskać, nie mają prawa straszyć, uświadom to sobie i przestań się ich bać, bo oni żerują na strachu społeczeństwa!!! Moja po pentaximie była 2 lata usprawiana fizycznie i psychicznie (uszkodzenia neurologiczne), do tego alergię zaraz po pierwszej dawce (do tej pory problemy skórne). I mam świadomość, jak dużo miałyśmy szczęścia, że po drugiej dawce zorientowałam się co jest grane, bo po trzeciej prawdopodobnie miałabym już kalekę w domu.... Odwagi kobieto, bo chodzi o zdrowie i życie Twojego dziecka i funkcjonowanie Twojej rodziny - bo to Wy zapłacicie za wszystkie skutki jeśli wydarzy się tragedia, pani doktor i państwo wypną się na Was i zamiotą sprawę pod dywan, tak jak w dziesiątkach tysięcy innych przypadków poszczepiennych!!!!...

[21.stycznia 2014 o 15:54](#) · [23](#)



Magda Sowińska alleluja!!! masz całkowitą rację Aga Nieszczep!

[25 lutego 2014 o 04:56](#)



Karolina Korolczuk Młodsza córka po szczepionce p. błonica, tężec, krztusiec o ile dobrze pamiętam to Pentaxim wylądowała w szpitalu ze względu na zapalenie płuc. Nikt tego nie powiązał ze szczepieniem. Poza tym na wszystkie inne szczepionki zawsze reagowała wielkimi, bolesnymi, czerwonymi obrzękami w miejscu wkłucia niezależnie czy czepiona była pojedynczo (na początku) czy też szczepionkami skojarzonymi (po 6 miesiącu życia, myśleliśmy że będzie łagodniej to znosiła ale niestety efekt był taki sam). Natomiast starsza po szczepionce jaką dostała w szpitalu zaraz po urodzeniu płakała tak jakby ją ze skóry obdzierali przez ponad 6h i nie byłam jej w stanie uspokoić - reakcja położnych i lekarzy "cóż, pewnie taka z niej już humorzysta aparatka" (nie wiem jak o 2 dniowym noworodku można powiedzieć że jest humorzasty), kolejne szczepienia ciągle z podwyższoną temperaturą, obrzękiem i lekkim zaczerwienieniem w miejscu wkłucia, czasem wymioty. Do tego wszystkiego inne problemy, bardzo słaba odporność, u młodszej astma oskrzelowa i alergię u starszej alergię gdzie w naszej rodzinie nie ma takich chorób, nikt nie jest alergikiem więc jak na rodziców u których w rodzinie nie ma i

nie było przypadków alergii dwójka dzieci ma alergię stwierdzoną to bynajmniej jak dla mnie jest to bardzo dziwne.

[25 lutego 2014 o 05:57](#) · [Edytowany](#)



Izabela Gos Ja już obleciałam wszystkich lekarzy i wszędzie mówią to co opisujecie ,wczoraj zostałam prawie wyrzucona z gabinetu bo się propagandę antyszczepionkową ,a była to moja ostatnia nadzieja .Dlatego nie mam co liczyć już na zrozumienie tylko wziąć sprawy w swoje ręce .

[25 lutego 2014 o 08:33](#) · [1](#)



Dominika Kurzyńska A czy jak szczepię standardowo nie odpłatnie to też mam się obawiać bo właśnie się zastanawiam czy nie zrezygnować całkiem ze szczepień

[20 marca 2014 o 15:53](#) · [1](#)



Katarzyna Kasińska dlaczego Pentaxim o numerze serii K 4120-1 został wycofany? co konkretnie z nim nie tak jest?

[25 marca 2014 o 09:26](#)



Joanna Błasiak Ponawiam pytanie. Ktoś wie co się dzieje z Pentaximem?

[27 marca 2014 o 22:59](#)



Natalia Gomolczyk No właśnie wycofany i nie wiem co dalej? 2 tygodnie temu miałam termin podania kolejnej szczepionki - 5 mc życia. Z tego co wyczytałam wcześniej, nie powinno się zmieniać producenta. Nie bardzo wiem co teraz robić Emotikon frown

[28 kwietnia 2014 o 02:24](#)



[Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP
NOPhttps://www.facebook.com/photo.php?](#)



Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Rodzice pięciorga dzieci oskarżają szczepionki o spowodowanie u nich kalectwa. Pięć francuskich rodzin połączyło siły, aby pozwać koncerny GlaxoSmithKline, Pfizer i Sanofi do sądu. Mają nadzieję, że sądy uznają skutki uboczne szczepionek i przyznają odszkodowania dla ich niepełnosprawnych dzieci. W ostatni piątek ich prawnik, pan Hartemann, przedstawił sprawę przed Trybunałem Bobigny na przedmieściach Paryża. Zwracając się do sądu w półtoragodzinnej mowie, Hartemann twierdził, że jest "mile zaskoczony" że producenci szczepionek nie wyrażają sprzeciwu wobec badań medycznych w czterech z pięciu przypadków. Stanowi to pierwsze "zielone światło", które po zatwierdzeniu przez sąd utoruje drogę do dalszych badań i badań nad rzadkimi chorobami, które dotknęły te dzieci powodując rozwinięcie się bardzo poważnych zaburzeń neurologicznych po otrzymaniu szczepionki." Cierpią na skutki uboczne podobne do tych wynikających z dużych urazów głowy lub napadów padaczkowych, powodując bardzo poważne uszkodzenie mózgu", stwierdził prawnik. "To są dzieci, które były całkowicie zdrowe, zanim otrzymały zastrzyk.", kontynuuje podkreślając podobieństwo tych opowieści, "a u których nagle po pierwszych szczepionkach, zatrzymał się rozwój i pojawiły się bardzo znaczne szkody".

"Co mogło spowodować zanik części mózgu, która kontroluje u Nello wszystkie umiejętności motoryczne?"

Nello (3 lata), Naomie (4 i pół roku), Lucia (3 lata), Lolita (18 miesięcy), Terry (15 lat)... pięciorgo dzieci, które rozwijały się normalnie, ale których stan pogorszył się zaledwie w kilka dni lub tygodni od szczepienia. Bardzo wysoka gorączka, płacz, utrata mięśni, sztywnienie ciała.... To były niepokojące objawy zaobserwowane przez rodziców. Teraz te dzieci nie są w stanie chodzić, mówić, a nawet trzymać głowy, walczą żeby jeść, pić i trzymać coś w rękach.... Żadne z wielu przeprowadzonych badań i prób podejmowanych na oddziale neuropediatrici nie ujawniła przyczyny dolegliwości. Nello dostał bardzo

wysokiej gorączki po szczepionce Priorix (produkowanej przez GSK szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce) gdy miał 19 miesięcy. Tydzień później jego rodzice zauważyli, że ma ciągle kciuki zaciśnięte wewnątrz pięści. Osiem dni później gdy wstawał wspierając się nadgarstkami zaczął przewracać się jak Bambi na lodzie. Miesiąc później Nello został przewieziony na izbę przyjęć krzycząc z bólu, jego ciało było skulone a mięśnie sztywne. Badanie mózgu wykazało zanik istoty białej (mieliny), ale zestaw testów, które sprawdzających jakiegokolwiek przyczyny genetyczne, zakaźne lub traumatyczne, wyeliminował je." Co może być przyczyną zaniku części mózgu, która kontroluje u Nello wszystkie umiejętności motoryczne ?", pyta matka, Sandrine.

Nello w ramionach ojca.

"Naomie urodziła się przedwcześnie, ale jej rozwój był w porządku, dopóki nie otrzymała pierwszej dawki szczepionki Infanrix Hexa (produkowanej przez GSK szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenza typu B) oraz Prevenar 13 (produkowanej przez Pfizer szczepionki przeciwko pneumokokom)", wyjaśnia jej matka, Mona. Po tygodniu ciągły płacz, wzięliśmy ją na pogotowie: zez i utrata napięcia wszystkich mięśni (nie mogła siedzieć sama). Lekarze nie byli w stanie postawić diagnozy .

Lucia prawie umarła z zapaleniem mózgu, które doprowadziło do utraty wzroku i paraliżu wszystkich kończyn .

Dwa miesiące po otrzymaniu przez Lucię Infanrix hexa i Priorix w wieku 18 miesięcy , jej matka znalazła ją nieprzytomną w jej łóżku "jak szmacianą lalkę ". Zabrano ją do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali zapalenie mózgu. Trzy dni później przeszła operację mózgu, co niemal kosztowało ją życie, a po miesiącu śpiączki, obudziła się niewidoma i sparaliżowana. Wykluczono chorobę zapalną i wirusową jako przyczynę tych objawów neurologicznych.

Lekarze nie byli w stanie również postawić diagnozy dla małej 18-miesięcznej Lolity. Jej problemy zaczęły się gdy w wieku dwóch miesięcy w zaledwie dwa tygodnie po jej pierwszym ukłuciu szczepionką Infanrix hexa i Prevenar 13, dostała chwilowego napadu: "Jej ciało było usztywnione, jęczała i charczała oraz nie reagowała na światło", informuje matka. Po drugiej dawce w trzecim miesiącu została przewieziona do oddziału ratunkowego: "Moja córka była sztywna, dłonie zaciśnięte w pięści, nie mogła utrzymać głowy." Jak dotąd badania genetyczne u Lolity nie doprowadziły do żadnych wniosków. 15-letni Terry doznał "nieokreślonego" zapalenia mózgu, gdy miał zaledwie 12 miesięcy, a 80 % jego funkcji jest obecnie wyłączona. Pierwsze objawy choroby pojawiły się gdy miał dwa i pół miesiąca, po pierwszej dawce Pentacoq (produkowana przez Sanofi szczepionki przeciwko krztuścowi, Haemophilus B, błonicy, tężcowi i polio, wycofanej z rynku w 2005 roku): wysoka gorączka, uporczywy krzyk, przewlekłe zapalenie oskrzeli i trzy tygodnie później porażenie prawej strony ciała (od biodra do ramienia).

We wszystkich pięciu historiach rodzice mówią, że ich lekarze twierdzą, iż szczepionki nie mogą być za to odpowiedzialne. "Konsultanci, lekarze i neuropediatrzy, wszyscy zaprzeczyli tej hipotezie. Temat jest całkowicie tabu.", mówi Lionel, ojciec Nello. "Dla nich związek ze szczepionkami nie jest możliwy, ponieważ badania naukowe tego nie potwierdzają.", dodaje Sabrina, matka Luciji, która sugeruje, że to może być predyspozycja genetyczna: " Być może ryzyko jest bardzo rzadkie , ale dotyczy niektórych dzieci".

(...) Więcej dowiemy się 19 lutego, kiedy rodziny dowiedzą się czy badania lekarskie zostały uznane przez sąd.

Na zdjęciu od lewej do prawej: Naomie , Lolita , Lucia i Terry. Nello nie ma na zdjęciu ze względu na pobyt w szpitalu.

Paris Match (tłumaczenie fragmentów) 07.02.2014

Całość: <http://www.parismatch.com/.../Cinq-familles-devant-la-justice...>

[8 czerwca 2014 o 14:09](#) · 1



Kinga Stec witam a ja mam pytanie czy jest ktos kto wogle odmowil jakichkolwiek szczepien . ja za miesiac rodze i mam straszna ochote powiedziec ze na nic nie chce szczepien poczawszy od wzv i gruzlice w 1 dobie i dalej tez - czy ktos zna przyzpadki ze nieszczepil wogle i dziecko zachorowalo na tezec czy blonice czy krztusiec?

[4 listopada 2014 o 02:33](#)



Agnieszka Wojtkowska jestem przeazona tym co tu przeczytałam... bardzo współczuje rodzicom dzieciaczek, które tak tragicznie przeszły szczepienia... nie wiem co teraz mam myśleć... mój synek 16 miesięcy miał przedwczoraj kolejną dawkę infanrix 5 w1... do tej pory nie miałam tak mocnych odczynów, właściwie to bardzo dobrze znosił szczepienia, gdzie uprzedzano mnie, że mogą być obrzęki i wysokie gorączki, nic takiego nie miało u nas miejsca, może lekkie zaczerwienienie i guzek ale słabo wyczuwalny a dziś... po spacerze zauważyłam że udo jest mocno spuchnięte, zaczerwienione i wręcz twarde, obłożyłam altacetem junior ale nie zniknął obrzęk... nic więcej nie dolega mojemu synkowi ale mimo to martwię się, po tym co tutaj przeczytałam... powinnam pójść do lekarza?? zgłosić to, pokazać ten obrzęk?? wiem co usłyszę, że to normalny objaw i nie potrzebnie panikuję... powinnam panikować?? dziwnie się z tym czuję.... no nic, bacznie obserwuję wszelkie odchylenia od normy u mojego dziecka, jeśli cokolwiek innego dojdzie oprócz tego obrzęku, to nie mam zamiaru zwlekać i pójdę na pogotowie, niech lekarze sobie mówią co chcą! Modlę się tylko, żeby nic więcej nie doszło....

[13 listopada 2014 o 10:54](#)



Patrycja Długosz mówiłam ..

[12 grudnia 2014 o 11:34](#)



Ula Chojnacka Kinga Stec wejdź na szczepienia.org.pl i stop nOP na fb tam jest mnóstwo przypadków różnych są też osoby których dzieci miały krztusiec ospe odre i przeszły to łagodnie w kilka dni tym lepiej im mniej dziecko szczepione o dziwo... nieraz dzieci po szczepieniach chorują i to nieraz w ciężkim przebiegu dodam że szczepienia działają ok kilku lat w zależności od szczepionki a dorośli się nie doszczepiają a to oni mogliby chorować najczęściej na te choroby wieku dziecięcego! i to oni mogą zarazić oraz ich dzieci zaszczepione szczepionką z żywym wirusem np polio dtp~przez 3 tygodnie! ale oskarżają o zarażanie dzieci antyszczepionkowców

[22 stycznia o 11:18](#)



Patrycja Polańska-Krzywonos poczytałam sobie i moje dziecko jednak miało NOp-a po 1. i jak na razie jedynej dawce, wg. pani "dr" to że dziecko płakało przy dotyku, obudziła się z okropnym płaczem, nie było niczym groźnym, to był jedyny raz kiedy z nią płakałam

[19 lutego o 11:51](#)



Klaudia Schreiber Proszę o radę-w Czwartek byłam na szczepieniu mojego 9 tyg synka. Tydzień temu nie został zaszczepiony przez harczący oddech-diagnoza refluks z żołądka, dostał leki i po tygodniu szczepienie mimo że oddech ten sam. Prosiłam lekarza o receptę na 3w1 ale rzekomo nie ma takiej. Polecił mi 5w 1 pentaxim, i tak zaszczepiłam. Praktycznie zaraz po powrocie do domu dziecka nie poznałam-marudne, płaczliwe, brak apetytu, w nocy gorączka, krzyczy przez sen, wymaga noszenia. Dodam, że dziecko dotychczas w ogóle nie płakało.wczoraj poszłam zapytać lekarza czy to skutki poszczepienne-odpowiedział że początek infekcji .Jestem pewna, że to efekt szczepienia. Co zrobić żeby go już nie szczepić? Iść do innego lekarza, który wystawi opinię że to skutki poszczepienne? Czy po prostu nie zgłaszać się na kolejne wizyty? Wiem, że sanepid ściga i wzywa na szczepienia.Czy powtórzyć tylko wzw czy na to też

juz nie szczepić. Jakie mogą być skutki tego co już dostał? Kiedy można ocenić na ile to wpłynęło na jego rozwój? Jestem przerażona i wściekła, że zaufalam lekarzowi. Proszę o pomoc!!

[21 lutego o 14:25](#)



Monika Korin Kinga Stec, ja od razu po przyjęciu do szpitala powiedziałam, że nie wyrażam zgody na szczepienie i żeby to wpisali. Córeczka dostała jednak w 4 dobie wzw B i przeciwko gruźlicy, bo przyszła lekarka i "złamała" mnie kategorycznym tonem, że robię krzywdę dziecku! Byłam rozdygotana i uległam. Okropnie żałuję! Potem szczepiłam z opóźnieniem kilku miesięcy i nie na wszystko. Ale dziecko choruje, ma słabszą pamięć, brak koncentracji, a jako 18 miesięczna znała 20 liter!

[24 marca o 16:25](#)



Malgorzata Krolikiewicz Dlatego ja tez nie szczepilam mojego synka, oprócz tego co czytałam na temat szczepionek że to samo zło, to najważniejsze co ludzie mówią, ja bardzo współczuję wszystkim którzy dzieci zmarły po szczepionkach oraz te które mają uszczerbek na zdrowiu. Ja mam koleżankę która dwojkę dzieci nie szczepiła, rozwijają się super, nie chorują, ospe jedna z dziewczynek przeszła bardzo łagodnie. Moją synka ma 9 miesięcy, jest zdrowy, super się rozwija, ani razu nie byłam jeszcze u lekarza, moja starsza córka szczepiona na wszystko zanim jeszcze się dowiedziałam co szczepionki zawierają!

[12 maja o 05:24](#)



Jagoda Wypyszyńska-Cieszkowska my jesteśmy po 2 dawkach Infanrix 5w1 i pneumokokach i nic - ani zaczerwienienia, ani stanu podgorączkowego. W dniu szczepienia większa senność (jedna drzemka więcej niż normalnie) i tyle

[8 czerwca o 02:47](#)



Mariola Panasiuk gjhkh'/k kb;;;/v'k'b'kl;'

[9 czerwca o 07:51](#)



Mariola Panasiuk '

[9 czerwca o 07:51](#)