



Bimatoprost Acheter Sans Ordonnance

Le bimatoprost est un analogue de la prostaglandine, utilisé principalement pour traiter le glaucome et l'hypertension oculaire. C'est un collyre relativement sûr et très efficace, qui a plusieurs effets positifs supplémentaires, ce qui rend la drogue très populaire parmi les cosmétiques. Le bimatoprost réduit la pression intra-oculaire, réduit la graisse autour des yeux et est censé stimuler la croissance des cils.

Dosage et administration

Le collyre de bimatoprost est appliqué à l'œil une fois par jour. Vous ne devez pas appliquer les gouttes dans les deux yeux, seulement pour celui qui a besoin de traitement. Il est préférable d'utiliser le bimatoprost au soir. Vous ne devriez pas surdoser le médicament. Pour ajuster la posologie, s'il vous plaît, consultez votre médecin.

Précautions

Lavez-vous soigneusement les mains avant d'appliquer le collyre pour les yeux. N'arrêtez pas d'utiliser le médicament sans avoir consulté votre médecin. Dites à votre médecin si vous êtes allergique à bimatoprost, si vous avez l'inflammation des yeux, utilisez d'autres médicaments ou vous avez une blessure à l'œil ou une infection.

Contre-indications

Il n'est pas recommandé d'utiliser un collyre bimatoprost dans le cas où vous êtes hypersensible au médicament. Ne pas utiliser le médicament si vous êtes allergique à ce produit, si vous êtes enceinte ou avez la chirurgie des yeux ou des [buy stromectol](#) blessures.

Effets secondaires possibles

Les effets indésirables de bimatoprost se manifestent habituellement comme une vision floue ou la croissance des cheveux inattendue. Vous pouvez également ressentir une gêne oculaire. Le bimatoprost provoque souvent un épaississement des cils, assombrissement de l'iris et d'autres effets secondaires.

Interaction des médicaments

Vous devez informer votre médecin de toutes les solutions médicales que vous prenez en même temps que vous utilisez le bimatoprost. Les vitamines, produits à base de plantes et de suppléments nutritionnels peuvent interagir avec ce médicament, en changeant son effet. Vous devriez également noter que les lentilles de contact souples peuvent absorber le médicament. Pour éviter ces effets, s'il vous plaît, ne portez pas de lentilles de contact 15 minutes après avoir appliqué les gouttes pour les yeux. Attendez au moins 5 minutes après avoir utilisé le bimatoprost, si vous devez utiliser un autre collyre.

Omission de dose

Essayez de ne pas manquer la dose du médicament, parce que l'effet maximal est atteint dans le cas quand le bimatoprost est appliquée régulièrement. Si vous avez manqué la dose, continuez à utiliser le médicament comme vous le faites normalement.

Surdosage

En cas de surdosage, s'il vous plaît, contactez votre médecin pour obtenir de l'aide. Si vous êtes sensible à la lumière ou si vous avez les yeux roses, consultez immédiatement un médecin.

Conservation

Gardez le bimatoprost dans un endroit sombre à température ambiante. Évitez la chaleur et de l'humidité. Stockez le Bimatoprost hors de la portée des enfants.

Disclaimer (avis de non responsabilité)

Nous fournissons des renseignements à caractères uniquement généraux sur les médicaments qui n'englobent pas tous les domaines, les polyvalences possibles du médicament, ou les précautions. Les renseignements sur le site ne peuvent être utilisés pour un traitement personnel et un diagnostic personnel. Toute instruction spécifique pour un patient particulier devrait être consultée avec votre conseiller de soins de santé ou votre médecin responsable du cas. Nous refusons toute référence au caractère indéniable de ces renseignements et des erreurs qu'ils pourraient contenir. Nous ne sommes pas responsables de tout dommage direct ou indirect, spécial ou d'autre dommage à la suite de toute utilisation des renseignements sur ce site et également pour les conséquences de l'auto-traitement.

[achat lumigan sans ordonnance](#)

[lumigan acheter sans ordonnance](#)

[bimatoprost 0.03% acheter sans ordonnance](#)

[achat bimatoprost sans ordonnance](#)